



Milkivit

10 goldene Regeln für einen optimalen **LIFESTART**

In der Kolostrumphase

1. Verfüttern Sie hochwertiges Kolostrum mit einem Brixwert von $\geq 25\%$.
2. Verfüttern Sie 4 Liter in den ersten 2 Stunden nach der Geburt.
3. Verfüttern Sie anschließend bis zu 2 Liter in den ersten 12 Stunden nach der Geburt.
4. Messen Sie das Gesamtprotein im Blutserum, um zu prüfen, ob die passive Immunisierung erfolgreich verlaufen ist. Zielwert: $> 6,5$ g/dl.
5. Unterstützen Sie die Futteraufnahme in der frühen Lebensphase. Durch Anbieten größerer Mengen erreichen die Kälber bald die Spitze der Futterkurve und verbessern dadurch ihre Energieaufnahme.

Nach der Kolostrumphase

6. Bieten Sie täglich geeignetes Kraffutter an und entfernen Sie Futterreste.
7. Verfüttern Sie täglich hochwertiges Kälberstroh.
8. Achten Sie darauf, dass die Tiere jederzeit Zugang zu frischem, sauberem Wasser haben.
9. Verfüttern Sie mindestens 8 Liter Milch in der frühen Lebensphase!
10. Beginnen Sie mit dem Absetzen frühestens nach 8 Lebenswochen. Die Absetzzeit sollte mindestens 3 Wochen betragen. Zielwert ist das 2,5-Fache des Geburtsgewichts beim Absetzen.

Eine bedarfsgerechte Ernährung in der frühen Lebensphase durch Verfüttern größerer Milchmengen verbessert Leistung und Entwicklung der Kälber und begünstigt ihre Immunität zugunsten höherer Produktivität über die gesamte Lebenszeit!

